

Beitrag

zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales und der angrenzenden Gebiete.

Von H. Kiefer, Admont und J. Moosbrugger, Feldkirch (Vorarlberg).

(Fortsetzung)

Pselaphidae.

Trimium brevicorne Reichb. Selztal, Bdf. (M).

Plectophloeus (Euplectus) Fischeri Aub. Bdf. n. selt. (M).

Euplectus brunneus Grimm. Bdf. an dürren Ästen (M).

Eupl. piceus Motsch. Bdf. (M).

Eupl. nanus Reichb. Bdf. (M).

Eupl. signatus Reichb. Kaiserau n. selt. bei *Formica rufa* (M).

Eupl. punctatus Muls. Bdf. (M).

Eupl. karsteni Reichb. Gesäuse (M).

Bibloplectus ambiguus Reichb. Selztal, Bdf. (M).

Bibloporus bicolor Denny Bdf., Liezen (M).

Brachygluta fossulata Reichb.; Krumauer Moor bei A. (K.), Selztal, Bdf. (M).

Brach. fossulata a. (v.) *rufescens* Reitt. Selztal (K.).

Brach. tristis Hampe Gesäuse, Bdf. Kalblinggatterl (M).

Brach. xanthoptera Reichb. Bdf. (M).

Brach. Klinschi Holdh. Admont 1 ♂. (K.). Bdf. im Frühjahr im Moore unter den Schilftristen und 3 ♀♀ im Heu 25. 3. (M).

Brach. haematica Reichb. Selztal (M).

Reichenbachia juncorum Leach. Selztal (M).

Bythinus crassicornis Motsch. Selztal, Bdf. (M).

Byth. bulbifer Reich. Selztal, Bdf. (M).

Byth. Curtisi Leach. Bdf. (M).

Byth. nodicornis Aubé Kaiserau, Bdf. n. selt. (M).

Byth. macropalpus Aubé Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Byth. Burrelli Denny Selztal, Bdf., Oppenberg n. selt. (M).

Byth. Brusinae Reitt. Bdf. (M).

Byth. validus Aubé Bdf. (B).

Byth. oreophilus Meixn. Bösenstein. Das einzige bekannte Exemplar wurde von Dr. J. Meixner hochalpin unter einem Stein gefunden.

Pselaphus Heisei Herbst, Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Psel. dresdensis Herbst Selztal (M).

Tyrus mucronatus Panz Selztal, Bdf. (M).

Tyrus mucronatus a. *niger* Füg. Bdf. (M).

Clavigeridae.

Claviger longicornis Müll. Bdf. (M).

Scydmaenidae.

Euthia plicata Gyllh. Bdf. (M).

Euthia scydmaenoides Steph. Bdf. (M).

Cephennium austriacum Reitt. Bdf. n. selt. (M).

Neuraptes elongatulus Müll. Selztal, Bdf., Gesäuse n. selt. (M).

Neuraptes Capellae Reitt. Bdf. n. selt. (M).

Stenichnus Godarti Latr. Bdf. bei *Formica rufa* (M).

Sten. scutellaris Müll. Bdf. n. selt. (M).

Sten. collaris Müll. Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Euconnus claviger Müll. Bdf. bei Ameisen (M).

Euc. Wetterhali Gyllh. Selztal, Bdf. (M).

Euc. Motschulskyi Sturm. Selztal, Bdf., Stainach z. hfg. (M).

Euc. denticornis Müll. Admont, Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Euc. similis Weise. Bdf.: Am Waldrand im Frühjahr in Anzahl aus Moos gesiebt. (M).

Euc. carinthiacus Ganglb. Bdf.: Am Waldrand unter Moos (M).

Euc. rutilipennis Müll. Selztal, Bdf. (M).

Euc. hirticollis Ill. Selztal, Bdf., Oppenberg n. selt. (M.)

Euc. oblongus Sturm. Bdf. (M).

Euc. pubicollis Müll. Selztal, Bdf. n. selt. (M.).

Euc. styriacus Grimm. Bdf., Kaiserau n. selt. (M.).

Scydmaenus tarsatus Müll. Bdf., Selztal n. selt. (M.).

Scyd. rufus Müll. Bdf., Selztal n. selt. (M.).

Silphidae.

Choleoa oblonga Latr. Umgebung v. A. 1 St. (K). det. Dr. Franz; Selztal (M).

Chol. cisteloides Fröl. Selztal, Bdf., Donnersbach n. selt. (M.).

Chol. agilis Ill. Selztal, Bdf. (M.).

Sciodrepa (Catops) fumatus Spence. Selztal, Bdf. (M.).

- Sciodrepa (Catops) Watsoni* Spence. Selztal, Bdf., Oppenbergn. selt. (M).
- Sciodrepa (Catops) Watsoni a. amoenus* Reitt. Selztal (M).
- Catops alpinus* Gyll. Bdf., Selztal, Oppenbergn. selt. (M).
- Cat. fuscus* Pz. Selztal (M).
- Cat. grandicollis* Er. Bdf. (M).
- Cat. nigrita* Er. U. v. A. und am Ennsufer (K.), Bdf., Oppenbergn. (M).
- Cat. coracinus* Kelln. Selztal, Oppenbergn. Bdf. (M).
- Cat. morio* Fabr. Selztal. Bdf. (M).
- Cat. longulus* Kelln. Bdf. (M).
- Cat. tristis* Panz. Hochhd.. Bdf. (M).
- Ptomaphagus variicornis* Rosh. Selztal, Bdf. (M).
- Colon latum* Kr. Kaiserau (M).
- Colon affine* Strm. Flitzen (M).
- Colon fuscicorne* Kr. Selztal (M).
- Colon brunneum v. nigriceps* Reitt. Bdf. (M).
- Colon appendiculatum* Sahlb. Bdf. (M).
- Colon fusculum* Er. Selztal (M).
- Colon viennense* Hbst. Bdf. (M).
- Necrophorus humator* Goeze Hall b. A. (am Fuße des Leichenberges) 1 St. (K). Selztal (M).
- Nec. investigator* Zett. Bdf., Oppenbergn. O. Zeiring 2 St. (E).
- Nec. vespilloides* Hbst. Selztal, Bdf. (M). O. Zeiring 1 St. (E).
- Nec. vespillo* L. U. v. A. nicht selt., auch ans Licht geflogen (K). Mühlau a. L., St. Lorenzen (K). Selztal, Oppenb. (M).
- Necrodes littoralis* L. Admont am Steinberger-Bühel 1 St. im Juli 1911 s. selt. (K).
- Thanatophilus sinuatus* F. Bdf. (M).
- Thanat. rugosus* L. U. v. A. (K). selt.
- Oeceoptoma thoracicum* L. Krumau b. Admont häufig an Aas (K).
- Aclypea (Blithophaga) opaca* L. U. v. A. (Schulterung am Weg) 1 St. Ennsbrücke 1 St. (K). Bdf. (M). O. Zeiring 1 St. (E).
- Blitophaga undata* Müll. U. v. A. (K). Selztal, Bdf., Oppenbergn. (M).
- Silpha obscura* L. U. v. A. u. Frauenberg z. hfg. (K). Selztal, Bdf. (M).
- Sil. tristis* Illig. (*granulata* Thunb.) Aigen b. Admont selt. (K). Selztal (M).
- Silpha tyrolensis v. nigrita* Creutz. U. v. A., Hohentauern, Sulzkarhund, Zeyr. K., Stein a. M., Himmeleck (K.).

Phosphuga atrata L. U. v. A. und Gams b. H. hfg. (K). Admonterhaus (K).

Phos. atratra a. pedemontana Fab. (*a. brunnea* Hbst.) U. v. A. und Gams b. H. (K).

Necrophilus subterraneus Dahl. In allen Höhenstufen: Aigen b. A., Adm.-Haus Ttgeb. (K). Spfd., Voralpe, Tbt., Stoderzinken, Selztal (an Fleischköder) (M).

Liodidae.

Hydnobius punctatus Sturm.; Admonterhaus (K). Bdf. (M). z. selt.

Hyd. multistriatus Gyllh.; Bdf., Oppenberg (M).

Liodes dubia Kugel.; Hhd., Bdf., Kalblinggatterl (M).

L. Triepkei Schmidt; Bdf. (M).

L. obesa Schmidt; U. v. A. (K). 1 St.

L. calcarata Er.; Selztal, Oppenberg, Stoderz. (M).

L. calcarata a. nigrescens Fleisch.; Bdf. (M).

L. ovalis Schmidt; Selztal, Bdf. n. selt. (M).

L. nigrita Schmidt; Bdf. z. selt. (M).

L. hybrida Er.; Bdf. 23. 8. 1930 im Holzschlag gekötschert (M).

L. pallens Sturm; Selztal, Bdf. (M).

L. pallens v. rotundata Er.; Krumauer Moor selt. (K). Selztal, Prebichl (M).

L. badia Strm.; Admont, Selztal, Bdf. (M).

L. parvula Sahlb.; Bdf., Wörschach z. selt. (M.).

L. nitidula Er.; Vom Tale bis ins Krummholtz, unter Laub- und Nadelstreu: Kaiserau, Hhd., Bdf., Tbt.; im Moos (M.).

Agaricophagus cephalotes Schmidt; Bdf. (M).

Colenis immunda Sturm; Bdf., Wörschach (M.).

Cyrtusa minuta Ahrens; Bdf., Selztal, Stainach (M.).

Anisotoma humeralis F.; Bdf., Selztal, Paß Stein (M.).

Anis. castanea Herbst.; Selztal, Bdf. (M.).

Anis. glabra Kugel.; Bdf. (M.).

Anis. orbicularis Herbst.; Bdf., Selztal (M.).

Amphicyllis globus F.; Bdf., Selztal, St. Gallen (M.).

Agathidium nigripenne F.; Selztal, Sunk, Gesäuse n. selt. (M.).

Agath. atrum Payk.; Oppenberg (M.).

Agath. seminulum L.; Bdf., Selztal, Gesäuse n. selt. (M.).

Agath. laevigatum Er.; Bdf., Gesäuse (M). n. selt.

Agath. bohemicum Reitt.; Bdf., Selztal, Gesäuse n. selt. (M.).

Agath. badium Er.; Bdf., Gesäuse, Pyhrnpaß (M.).

Agath. marginatum Strm.; Bdf. (M). O. Zeiring (M.).

Agath. varians Beck.; Selztal, Aussee, Oppenberg n. selt. (M).
Agath. mandibulare Strm.; U. v. Admont (K).

Clambidae.

Calyptomerus alpestris Redtb.; Bdf., Kaiserau, Seck. Z. n. selt. (M).
Clambus minutus Strm.; Bdf., n. selt. (M).
Clambus punctulum Beck.; Bdf., Wald z. selt. (M).
Clambus armadillo Deg.; Bdf., Selztal n. selt. (M).

Leptininae.

Leptinus testaceus Müller; Bdf. z. selten (M.)

Corylophidae.

Orthoperus atomus Gyll.; Bdf. n. selt. (M.).

Ptiliidae (Trichopterygidae).

Ptenidium myrmecophilum Motsch.; Bdf., Kaiserau (M).
Pten. pusillum Gyll.; Selztal s. hfg. (M). det. Dr. Franz.
Pten. nitidum Heer; Bdf., Selztal n. selt. (M). det. Dr. Franz.
Ptilolum fuscum E.; Bdf. (M).
Ptilium myrmecophilum Allib.; Kaiserau (M). Bdf. (M). det. Dr. Franz.
Baeocrara variolosa Muls. (*littoralis* Thoms.); Gaishorn (M).
Acrotrichis grandicollis Mannh.; Bdf. n. selt. (M). det. Dr. Franz.
Acrotrichis atomaria Deg.; Bdf. einzeln (M). det. Dr. Franz.
Acrot. intermedia Gillm.; Selztal, Bdf., Seck. Z. n. selt. (M). det. Dr. Franz.
Acrot. fascicularis Herbst.; Bdf. (M).
Acrot. sericans Heer; Bdf. n. selt. (M). det. Dr. Franz.

Scaphidiidae.

Scaphidium 4-maculatum Oliv.; Selztal, Bdf.. U. v. A. z. hfg. (M u. K).
Scaphosoma agaricinum L.; Selztal, Bdf., Oppenberg n. selt. (M).
Scaphosoma assimile Er.; Bdf., einige Stücke an einem Hollunderstock (M).

Histeridae.

Platysoma frontale Payk.; Bdf. (M.).
Platysoma angustatum Hoffm.; Mautern, Windisch-Garsten einzeln (M.).

- Hister unicolor* L.; U. v. A. (K). Bdf. (M). n. selt.
H. merdarius Hoffm.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. (M). n. selt.
H. cadaverinus Hoffm.; Krumau b. A. n. selt. (K). Selztal, Bdf., (M).
H. striola Sahlb.; Selztal, Oppenberg, Gams b. H., Bdf. (M).
H. terricola Germ.; Selztal, Oppenberg (M).
H. stercorearius Hoffm.; Hall b. A. (K). O. Zeiring 1 St. (E).
H. purpurascens Herbst; Bdf., St. Michael (M).
H. ruficornis Grimm.; Bdf. (M).
H. ventralis Mars.; Bdf. (M).
H. carbonarius Illig. (Hoffmann); Bdf. (M). O. Zeiring 1 St. (E).
H. funestus Er.; Bdf. (M).
H. bissexstriatus F.; U. v. A. und Gams b. H. n. selt. (K). Selztal (M).
H. duodecimstriatus a. *quatuordecimstriatus* Gyll.; Bdf. (M).
H. bimaculatus L.; U. v. A. (K). Bdf., Selztal (M). n. selt.
Dendrophilus pygmaeus L.; Bdf. n. selt. (M).
Micromalus (Paromalus) parallelepipedus Herbst; Bdf., Selztal n. selt. (M).
Myrmetes piceus Payk.; Bdf. bei *Formica rufa* (M).
Gnathoncus punctulatus Thoms.; Bdf., Selztal n. selt. (M).
Saprinus semistriatus Scriba; Bdf. (M).
Sap. rugiceps Duft.; Krumau b. A. n. selt. (K.) Selztal (M).
Plegaderus discisus Er.; Selztal (M).
Onthophilus striatus Forster; Selztal, Bdf., Oppenberg, Altenmarkt n. selt. (M).
Acritus nigricornis Hoffm.; Bdf.. Oppenberg n. selt. (M).

Hydrophilidae.

- Helophorus aquaticus* L.; U. v. A. (K.) Bdf. (M).
Helophorus arvernicus Muls.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Hel. nivalis Giraud.; Sub- u. hochalpin: Kaiserau, Leobner, Schüttkogel, Seck. Z., T. Geb. überall n. selt. (M).
Hel. glacialis Villa; Hhd., Stein a. M., Leobner (M).
Hel. granularis L.; U. v. A. hfg. (K). Selztal, Bdf. (M).
Hel. viridicollis Steph.; Selztal, Bdf. (M).
Hel. asperatus Rey. (= *crenatus*); Selztal, Bdf., Oppenberg n. selt. (M).
Hel. dorsalis Marsh. (= *quadrisignatus* Bach.); Geirkogel (Seck. Alp.) (K). Bdf. (M).
Ochthebius granulatus Muls.; 1 St. im Bärndorfer Bach (M).

- Hydraena riparia* Kug.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. einzeln (M).
- Hydr. gracilis* Germ.; Selztal, Oppenberg, Stainach (M).
- Hydr. atricapilla* Waterh.; Selztal (M).
- Hydr. pygmaea* Waterh.; Bdf. (M).
- Berosus luridus* L.; Selztal (M).
- Hydrophilus caraboides* L.; U. v. A. (K). Selztal (M). n. selt.
- Hydrobius fuscipes* L.; U. v. A. n. selt. (K).
- Hydrobius fuscipes a. subrotundus* Steph.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).
- Anacaena globulus* Payk.; U. v. A. (K). Selztal, Kaiserau n. selt. (M).
- Anacaena limbata* F.; Selztal, Wörschach (M).
- Enochrus (Philydrus) minutus* Fab.; Wörschach (M).
- Enochrus (Phil.) coarctatus* Gredl.; Wörschach (M).
- Enochrus (Phil.) frontalis* Er.: Admont (M). Bdf., Wörschach (M).
- Enochrus (Phil.) fuscipennis* Thoms.; U. v. A. (K). Selztal, Gaishorn (M).
- Enochrus (Phil.) testaceus* F.; Gaishorn (M).
- Helochares griseus* Fab.; Selztal, Windischgarsten (M).
- Laccobius minutus* L.; U. v. A. (K). Selztal, Gaishorn n. selt. (M).
- Lacc. striatulus* F. (*nigriceps* Thoms.); Gaishorn (M).
- Lacc. scutellaris* Motsch.; Bdf. (M).
- Lacc. bipunctatus* F. (*alutaceus* Thoms.); Selztal, Gaishorn, Triesenstein (M).
- Chaetarthria seminulum* Hbst.; Bdf. (M).
- Limnebius truncatellus* Thunbg.; U. v. A. (K). Bdf., Oppenberg (M).
- Limn. papposus* Muls.; Selztal, Wörschach (M).
- Limn. crinifer* Rey.; Selztal, Wörschach (M).
- Coelostoma orbiculare* F.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. hfg. (M).
- Sphaeridium scarabaeoides* L.; Aigen b. A. (K und Strobl) überall hfg. (M).
- Sph. scarab. a. (syn.) maculatum* Küst.; O. Zeiring 2 St. (E).
- Sph. scarab. v. lunatum* F.; Krumau b. A. (K). O. Zeiring 1 St. (E).
- Sph. 4-maculatum* Marsh. (*bipustulatum* F.); U. v. A. und Krumau b. A. z. hfg. (K).
- Cercyon ustulatus* Preyssl.; Selztal, Bdf., Gaishorn (M).
- Cerc. impressus* Sturm; Stein a. M. (K). Bdf., Kalblinggatterl, Seck. Z. (M).
- Cerc. haemorrhoidalis* F.; U. v. A. (K). Bdf. (M). gemein.
- Cerc. melanocephalus* L.; U. v. A. (K). Bdf., Hhd. (M).
- Cerc. lateralis* Marsh.; Bdf. (M).
- Cerc. unipunctatus* L.; U. v. A. (K). Bdf. (M). n. selt.

- Cerc. quisquilius* L.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Cerc. terminatus Marsh.; Bdf., Selztal (M).
Cerc. pygmaeus Ill.; Kaiserau, Selztal, Bdf. (M).
Cerc. pygmaeus a. merdarius Sturm; Selztal (M).
Cerc. nigriceps Marsh.; Bdf.; Hhd. (M).
Cerc. granarius Er.; Selztal (M).
Cerc. analis Payk. (= *flavipes* Thunbg.); Bdf. (M).
Magasternum boletophagum Marsh.; U. v. A. (K). Kaiserau, Bdf. (M). z. hfg.
Cryptopleurum minutum F.; Selztal, Bdf. hfg. (M).
Cryptopleurum crenatum Panz.; Selztal, Bdf. (M).

Cantharidae.

- Homalisus Fontisbellaquei* Fourc. (Geoffr.); T. Geb. b. Liezen (K).
 Selztal, Bdf., Oppenberg hfg. (M).
Dictyopterus aurora Herbst; U. v. A., Gesäuse, Hohentauern gegen Scheiplalm (K). Bdf., Oppenberg (M).
Dict. rubens Gyll.; Spitzbachgraben b. St. Gallen, Aigen b. A. (K). Gesäuse, St. Gallen Bdf. (M).
Dict. (Pyropterus) affinis Payk.; Selztal Bdf. (M).
Dict. (Platycis) Cosnardi Chevr.; St. Gallen (M).
Platycis minuta F.; Kaiserau (K).
Lygistopterus sanguineus; Gesäuse, U. v. A. (K). Bdf., Oppenberg (M), am Weg zur Koralpe unter 1800 m 4 St. (K). O. Zeiring 2 St. (E).
Lampyris noctiluca L.; Selztal, Spfd. (M).
Phausis splendidula L.; Stiftsgarten, U. v. A., Gstatterbodenbauer im Gesäuse (K) gemein. Bdf. (M). hfg.
Podabrus alpinus Payk.; Kematen (Kalkofen), Triebental auf Fichten (K) Bdf. (M).
Pod. alpinus v. annulatus Fisch.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).
Pod. alpinus a. lateralis?; Bdf., Hhd. (M).
Fod. alpinus v. Moequerisi Reichl.; Admont am Licht 1 St. (K)
 Pleschalm (K). Bdf., Veitlgraben b. A. (M).
Cantharis abdominalis; U. v. A. Gesäuse, Mühlau (K) Selztal,
 Oppenberg, Paß Stein n. selt. (M).
Canth. abdominalis v. occipitalis Rosenh.; Veitlgraben b. A., Spitzbachgraben b. St. Gallen (K). Kaiserau (M).
Canth. violacea Payk.; Selztal, Bdf., Oppenberg, Wörschach, Ge-
 säuse (M).
Canth. Erichsoni Bach.; Bdf., Landl (M).

- Canth. rustica* Fall.; Aigen b. A. auf Sumpfwiesen (K). Bdf. gemein (M).
- Canth. tristis* F.; Selztal, Geierkogel (M). Zeir. K., Spitzenbachgraben (K).
- Canth. obscura* L.; Gesäuse, Tbt., Spitzenbachgraben (K). Bdf. (M).
- Canth. fibulata* Märk.; In der obersten Waldregion: Hhd. (M).
- Canth. albomarginata* Märk.; Bdf., Selztal (M).
- Canth. nigricans* Müll.; U. v. A., Aigner Moor b. A. n. selt. (K). Gesäuse, Kainisch (M). O. Zeiring 1 St. (E).
- Canth. pellucida* F.; Aigen b. A., Krumau b. A. n. selt. (K). Bdf. (M).
- Canth. livida* a. *rufipes* Herbst; U. v. A., (K). Gesäuse, Selztal (M).
- Canth. figurata* Mannh.; Bdf., Stainach (M).
- Canth. figurata* a. *luteata* Schilsky; Selztal, Bdf. (M).
- Canth. quadripunctata* Müll.; Gesäuse, U. v. A. (K), Paß Stein (M).
- Canth. quadripunctata* v. *montana* Stierl.; Gesäuse (K). Bdf. (M).
- Canth. sudetica* Letzn.; Selztal, Bdf., Gesäuse, Paß Stein (M).
- Canth. ruta* L.; Selztal, Bdf., Kraubath n. selt. (M).
- Canth. pallida* Goeze; Bdf., Selztal (M).
- Canth. fulvicollis* F.; U. v. A. (Ennsufer) n. selt. (K). Selztal (M).
- Canth. fulvicollis* a. *maculata* Schilsky; Selztal (M).
- Canth. bicolor* Herbst; U. v. A. (Ennsufer) (K), Selztal (M).
- Canth. paludosa* Fall.; Selztal, Bdf., Admont (M).
- Canth. haemorrhoidalis* F.; Kraubath (M).
- Metacantharis (Cantharis) discoidea* a. *liturata* Redt.; Selztal, Bdf. Liezen (M).
- Podistra (Absidia) pilosa* Payk.; Subalpin auf Fichten und Lärchen: Gesäuse, Kalblinggatterl (M).
- Podistra (Absidia) prolixa* Märk.; Subalpin auf Fichten und Lärchen: Gesäuse (K). Kalblinggatterl, Hhd. (M).
- Rhagonycha translucida* Kryn.; Gesäuse (K). Oppenberg, Selztal (M).
- Rhag. nigriceps* Waltl; Flitzen, Kraubath (M). O. Zeiring 1 St. (E).
- Rhag. nigriceps* a. *atricapilla* Kiesw.; Gesäuse (Johnsbach) (K). Bdf. Griesk. (M).
- Rhag. lutea* Müll.; T. Geb., Weg zum Tbt., Rottenmann (K). Selztal (M).
- Rhag. lutea* a. *Märkeli* Kiesw.; Selztal (M).
- Rhag. fulva* Scop.; Aigner Moor, Krumauer Moor z. hfg. (K).
- Rhag. maculicollis* Märk.; Hhd. Leobner, Grsk., Gumpeneck (M).
- Rhag. testacea* L.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).

- Rhag. limbata* Thoms.; Hschwg., (K), Bdf., Liezen, Aussee (M).
Rhag. femoralis Brll.; U. v. A. n. selt. (K). Selztal, Spfd. (M).
Rhag. femoralis nigripes W.; Bösenstein (K). Kalblinggatterl (M).
Rhag. lignosa Müll.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf., Kammern (M).
Rhag. atra L.; U. v. A. n. selt. (K). Oppenberg, Hhd., T.-Geb. (M).
- Pygidia denticollis* Schumm.; Sub- und hochalpin im Grase; Geierkogel, Hochgrößen, Zeyr. K., Natterriegel (K). Kaiserau (M). bei Windischgarsten und Klaus im Tale! (M).
- Silis ruficollis* F.; Bdf. 1 ♂ im Juni 1939 (M).
- Malthinus biguttulus* Payk.; Selztal, Kaiserau, Bdf. (M).
Malth. flaveolus Payk.; Selztal, Bdf. (M).
Malth. flaveolus v. immunis Marsh.; Selztal (M).
Malth. seriepunctatus Kiesw.; (Leoben) (M).
Malth. glabellus Kiesw.; Klein-Reifling (M).
Malth. marginatus Latr.; Bdf. (M).
Malth. trifurcatus Kiesw.; Überall alpin; im Gesäuse bis ins Tal, Kaiserau, Bdf., Gumpeneck, Bst., Hauser Kalbling (M). Rößlb. Eisenerz (K).
Malth. trifurcatus a. atramentarius Kiesw.: Hhd., Grieskogel (M).
Malth. mysticus Kiesw.; Selztal, Bdf., Oppenberg, Gumpen, Scheiplalm (M).
Malth. spretus Kiesw.; Pleschalm ob Hall (K). Kalblinggatterl, Kammern (M).
Malth. fuscus Waltl; Selztal, Bdf., Bösenst., Flitzen (M).
Malth. flavoguttatus Kiesw.; Scheiplalm (M).
Malth. dispar Germ.; Selztal, Bdf. (M).
Malth. maurus Cast.; Kaiserau Bdf. (M).
Malth. maurus v. misellus Kiesw.; Selztal, Windischgarsten (M).
Malth. hexacanthus Kiesw.; Gesäuse, Selztal, Bdf., Hhd. n. selt. (M).
Malth. subductus Kiesw.; Kaiserau, Bdf. (M).
Troglops albicans L.; U. v. A., Landl (K). Bdf., Kraubath (M).
Charopus flavipes Payk.; Kaiserau, Selztal, Seck. Z. (M).
Hypebaeus flavipes F.; Bdf. (M).
Ebaeus pedicularius Schrk.; Kraubath (M).
Ebaeus flavidornis Er.; Bdf., Kaiserau. Leoben (M).
Attalus analis Panz.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).
Attalus alpinus Giraud; Kaiserau selt. (M).
Malachius aeneus L.; Selztal, Bdf. (M).
Mar. marginellus Ol.; U. v. A. (K). n. selt. Kammern (M). O. Zeiring 1 St. (E).

- Mal. bipustulatus* L.; U. v. A. Krumauer Moorwiesen, Hoffeld auf Getreide im Juni hfg. (K). Bst. (M).
- Mal. geniculatus* Germ.; Selztal, Wörschach, Kraubath (M).
- Anthocomus bipunctatus* Harr.; Bdf. 29. 6. 1928 (M).
- Anthocomus fasciatus* L.; Bdf. 10. 7. 1939 (M).
- Dasytes niger* L.; Selztal, Kaiserau, Wörschach, Oppenberg, Bst. (M).
- Das. alpigradus* Kiesw.; E. Rst., Natterriegel, Gesäuse, Stein a. M., Krumau bei Admont einzeln (K). Bst. (M).
- Das. obscurus* Gyll.; Kaiserau, Natterriegel, Zeyr. K., Kaseralm b. Obdach (K). Bdf., Hhd. (M).
- Das. coeruleus* Deg.; Kematen, Kaiserau n. selt. (K). Selztal, Gesäuse, Bdf. (M).
- Das. aerosus* Kiesw.; Selztal, Leoben (M).
- Das. plumbeus* Müll.; U. v. A. nicht selt. (K). Oppenberg (M).
- Das. fusculus* Illig; Selztal, Bdf. (M.)
- Haplocnemus nigricornis* F.; Selztal, Bdf., Mautern auf Nadelholz (M).
- Haploc. nigricornis* a. *chalybaeus* Germ.; Bdf. (M).
- Haploc. nigricornis* a. *fuscitibia* Muls.; Bdf. (M.).
- Haploc. Küsteri* Schilsky; U. v. A. (K). Kaiserau, Pürgg, E. Rst. (M).
- Danacea pallipes* Panz.; Bdf., Wörschach (M).
- Danacea morosa* Kiesw.; Natterriegel, Gesäuse (K). Bdf., Wörschach, Kraubath, Landl (M).

Cleridae.

- Opilo mollis* L.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. (M). O. Zeiring 1 St (E).
- Thanasimus formicarius*; U. v. A., Kematen n. selt. (M).
- Trichodes apiarius* L.; U. v. A., Gesäuse, Mühlau, Gams b. H. überall n. selt. (K). Oppenberg, (M). O. Zeiring 2 St. (E).
- Corynetes coeruleus* De Geer; Bdf. n. selt. (M).
- Necrobia violacea* L.; Selztal, Bdf., Stainach (M).
- Necrobia rufipes* De Geer; Admont 1 W (K).

Derodontidae.

- Derodontus macularis* Fuss.; Selztal im Dezember an einem verfilzten Fichtenstock (M). det. Holdhaus.
- Laricobius Erichsoni* Rosh.; Auf blühenden Föhren im Tale, auf Lärchen im Gebirge: Bst., Seck. Z., Selztal, Bdf., Hhd. (M).

Byturidae.

Byturus aestivus L.; U. v. A., Trieben z. hfg. (K).

Byt. aestivus a. bicolor Rtt.; Bdf. (M).

Byt. tomentosus F.; U. v. A. z. hfg. (K). Bdf. (M).

Byt. tomentosus a. ochraceus Scriba (*flavescens* Marsh.) Selztal (M).

Ostomidae.

Nemosoma elongatum L.; Bdf., Stainach unter Fichtenrinde n. selt. (M).

Ostoma ferruginea L.; U. v. A.; (K). Gesäuse, Kaiserau, Selztal (M).

Thymalus limbatus F.; Subalpin unter Fichten- und Buchenrinde: Kaiserau, Sunk b. Trieben, Triebenstein (M).

Sphaeritidae.

*Sphaerites glabratu*s F.; U. v. A. (K). Bdf., Strechen, Selztal an Aas, in menschl. Exkrementen und in schimmelnder Nadelstreu (M).

Nitidulidae.

Cateretes pedicularius L.; Admont, Bdf., Selztal (M).

Cateretes pedicularius a. pallens Rey.; Selztal, Bdf. (M).

Cateretes bipustulatus Payk.; Selztal (M).

Heterhelus scutellaris Heer.; Aigen b. A. (K). Bdf., Oppenberg (M).

Heterhelus solani Heer.; Bdf., Selztal, Oppenberg (M).

Brachypterus urticae F.; Bdf., Selztal, Oppenberg, Flitzenalm (M).

Brachypterus (Heterostomus) pulicarius L.; Bdf., Kaiserau. Scheiplalm (M).

Soronia punctatissima Illig.; U. v. A. (K). Bdf., Johnsbach, Oppenberg (M).

Soronia grisea L.; Selztal, Bdf. (M).

Epuraea deppressa Gyll.; U. v. A., Krumauer Torfstich hfg. (K). Haindlkar (K). Bdf. (M).

Ep. melina Strm.; (Er.) Bdf., Kaiserau, Oppenberg (M).

Ep. terminalis Mannh.; Bdf., Wörschach, Gams b. H. n. selt. (M).

Ep. binotata Reitt. (*nana*); Bdf., Kalblinggatterl z. hfg. (M).

Ep. neglecta Heer.; Bdf. (M).

Ep. rufomarginata Steph.; Bdf. (M). z. selt.

Ep. variegata Herbst.; Bdf., Kaiserau (M).

Ep. variegata a. variabilis Reitt.; Bdf. (M).

Ep. variegata a. monochroa Reitt.; Bdf. (M).

- Ep. unicolor* Ol. (*obsoleta* F.); Selztal, Bdf. (M).
Ep. longula Er.; Bdf., Mautern (M).
Ep. boreella Zett.; Bdf., Kaiserau, Hhd. (M).
Ep. angustata Strm.; Hohentauern, Hhd. (M).
Ep. pygmaea Gyll.; Bdf., Selztal Kaiserau (M).
Ep. pusilla Illig; Hall b. A. (K). Bdf., Selztal (M). n. selt.
Ep. abietina Sahlb. (I).; Selztal, Kaiserau (M).
Ep. oblonga Hbst.; Selztal, Bdf. (M).
Ep. thoracica Fourn.; Bdf. (M).
Ep. florea Er.; Bdf., Gams b. H., Wörschach (M).
Ep. laeviuscula Gyll.; E. Rst. (M).
Epuraea (Micrurula) melanocephala Marsh.; Bdf., Gesäuse, Selztal (M).
Epuraea (Omosiphora) limbata F. (Oliv.) Bdf., Selztal (M).
Omosita depressa L.; Selztal, Kaiserau, Oppenberg n. selt. (M).
Omosita colon L.; Bdf., Selztal n. selt. (M).
Omosita discoidea F.; Selztal, Bdf. (M).
Nitidula bipunctata L.; Krumau b. A., (K). Selztal, Bdf., Oppenberg (M).
Pria dulcamarae Scop.; Selztal, Bdf., Stainach (M).
Meligethes hebes Er.; Aigen b. A., Gesäuse (K). Bdf. (M). hfg.
Mel. atratus Ol. (*rufipes* Gyll.); Gams b. H., Bdf. (M).
Mel. lumbaris Sturm.; Selztal (M).
Mel. coracinus Sturm.; Prebichl z. Rößl (K). Bdf., Selztal (M). n. selt.
Mel. coracinus a. pumilus Er.; Selztal (M).
Mel. subaeneus Sturm.; Selztal, Bdf., hfg. (M).
Mel. aeneus F.; U. v. A. hfg. (K). Hhd., Bdf., Kalblinggatterl (M).
Mel. viridescens F.; U. v. A. und Kematen hfg. (K). Selztal, Oppenberg, Stoder Z. (M).
Mel. symphyti Heer.; Selztal, Bdf., Gesäuse n. selt. (M).
Mel. subrugosus Gyll.; Kaiserau, Selztal, Bdf. (M).
Mel. obscurus Er.; Bdf., Stainach (M).
Mel. bidens Bris.; Bdf., Selztal, Stainach (M).
Mel. maurus Sturm.; Bdf., Selztal, Pürgg (M).
Mel. picipes Sturm.; Bdf., Stainach (M).
Mel. difficilis Heer.; Kalblinggatterl, Selztal, Bdf. (M).
Mel. Kunzei Er.; Kalblinggatterl (M).
Mel. morosus Er.; Selztal, Bdf., Kalblinggatterl (M).
Mel. viduatus Sturm.; Admont und Umgebung (K). Bdf., Kalblinggatterl hfg. (M).

- Mel. sulcatus* Bris.; Bdf. (M).
Mel. assimilis Sturm.; Kaiserau, Bdf. (M).
Mel. tristis Sturm.; Bdf. (M).
Mel. planiusculus Heer.; Bdf. (M). n. selt.
Mel. egenus Er. Bdf. (M).
Mel. bidentatus Bris.; Bdf., n. selt., Hhd. (M).
Mel. erythropus Gyll.; Bdf., Gesäuse, n. selt. Hhd., O, Zeiring (M).
Mel. solidus Ill. Kugel; Kalblinggatterl (M).
Thalycra fervida Oliv.; Bdf. Geierkogel (K). Bdf. (M).
Pocadius ferrugineus F.; Kaiserau, Bdf. n. selt. (M).
Cychramus 4-punctatus Herbst.; Selztal, Bdf. (M).
Cychramus luteus F.; Admont (Ennsufer) (K) Gams b. H., Bdf. (M).
Cybocephalus politus Germ.; Bdf. z. hfg., Mautern (M).
Glischrochilus 4-punctatus L. (= *quadripustulatus*) U. v. A. und Leichenberg b. Hall n. selt. (K). Bdf., Oppenberg (M).
Pityophagus ferrugineus L.; Bdf., Selztal, Gesäuse, Oppenberg n. selt. (M).
Pityophagus ferrugineus a. *adustus* Rtt.; Bdf. (M).
Rhizophagus grandis Gyll.; Bdf. (M).
Rhiz. depressus F.; Bdf. (M).
Rhiz. ferrugineus Payk.; Selztal, Bdf., Gesäuse, Oppenberg (M).
Rhiz. perforatus Er.; Bdf. (M).
Rhiz. parallelocollis Gyll.; Bdf. (M).
Rhiz. nitidulus F.; Selztal, Kaiserau, Oppenberg, Bdf. hfg. (M).
Rhiz. dispar Payk.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Rhiz. bipustulatus F.; Bdf. (M).
Rhiz. bipustulatus a. *Gyllenhali* Thoms.; Bdf. (M).
Rhiz. picipes Ol. (*politus* Hellw.); Selztal (M).
Rhiz. cibratus Gyll.; Bdf. bei Ameisen (M).

Cucujidae.

- Monotoma angusticollis* Gyll.; Bdf. (M).
M. picipes Herbst.; Bdf. M.
M. testacea Motsch.; Bdf. (M).
M. longicollis Gyll.; Bdf. n. selt. (M.)
Silvanus bidentatus Fabr.; Bdf. n. selt., Oppenberg, Liezen (M).
Silvanoprus fagi Guér.; Bdf. n. selt., Selztal, Oppenberg (M).
Ahasverus (Cathartus) advena Waltl; Bdf. (M).
Dendrophagus crenatus Payk.; Kaiserau, mehrere Stücke hinter Fichtenrinde (M).

Laemophloeus alternans Er.; Bdf. n. selt. (M).

Laemophloeus clematidis Er.; Pürgg an Waldrebe (M).

Cryptophagidae.

Telmatophilus caricus Oliv.; Bdf., Selztal (M).

Telmatophilus typhae Fall.; Gaishorn (M).

Paramecosoma melanocephalum Herbst; Gaishorn, Bdf., Selztal (M).

Henoticus serratus Gyll.; Kalblinggatterl (M).

Micrambe abietis Payk.; Bdf., Selztal (M).

Cryptophagus pubescens Strm.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).

Cr. subdepressus Gyll.; Selztal, Bdf., Hhd. (M).

Cr. scanicus L.; Admont (K). Selztal, Bdf., Oppenberg z. selt. (M).

Cr. Thomsoni Reitt.; Bdf. (M).

Cr. cylindrus Kiesw.; Bdf. (M).

Cr. saginatus Strm.; Bdf., Selztal (M).

Cr. subfumatus Kr.; Bdf., Selztal (M).

Cr. dentatus Hrbst.; Selztal, Bdf., Wörschach n. selt. (M).

Cr. scutellatus Nevm.; Bdf. im schimmelnden Heu der Heustadel im Moor (M).

Cr. fumatus Mrsh.; Bdf. (M).

Cr. populi a. grandis Kr.; Selztal (M).

Cr. acutangulus Gyll.; U. v. A. (K). Bdf. (M). n. selt.

Cr. affinis Strm.; Bdf. (M).

Cr. Milleri Reitt.; Bdf. (M).

Cr. pilosus Gyll.; Bdf. (M).

Cr. lycoperdi Scop. (Hrbst.); Bdf. im Kartoffelbohist Oktober 1930 (M).

Cr. setulosus Strm.; Bdf. (M).

Cr. croaticus Reitt.; Bdf., Kaiserau n. selt. (M).

Emphyllus glaber Gyll.; Bdf. (M).

Antherophagus nigricornis F.; Bdf., Wörschach (M). z. selt.

Anth. pallens F. (Oliv.); Bdf., Kaiserau, Gams b. H. n. selt. (M).

Atomaria acutifrons Gglb.; Kraubath (M).

Atom. nigriventris Steph.; Selztal, Bdf. (M).

Atom. diluta Er.; Bdf. (M).

Atom. prolixa Er.; Bdf., Stainach (M).

Atom. prolixa a. = pulchra Er.; Bdf., Selztal (M).

Atom. fuscicollis Mannh.; Selztal, Bdf.; Gaishorn (M). n. selt.

Atom. impressa Er.; Selztal, Kaiserau (M).

Atom. plicata Reitt.; Selztal M.

Atom. gutta Steph.; Bdf. (M).

- Atom. gutta a. rhenana* Kr.; Bdf. (M).
Atom. gravidula Er.; Bd. (M).
Atom. fuscata Schönh.; Bdf. (M).
Atom. atricapilla Steph.; Selztal, Bdf. (M).
Atom. pusilla Payk.; Selztal n. selt., Hhd. (M).
Atom. ornata Heer.; Bdf., Selztal, Kaiserau z. hfg. in schim-
melnder Nadelstreu (M).
Atom. turgida Er.; Bdf., Selztal, Kaiserau n. selt. (M).
Atom. ruficornis Marsh.; Selztal, Bdf., Oppenberg z. hfg. (M).
Atom. analis Er.; Selztal, Bdf. (M), n. hfg.
Atom. cognata Er.; Selztal, Bdf., Kalblinggatterl (M). n. selt.
Atom. gibbula Er.; Bdf., Selztal (M). z. selt.
Atom. nigriventris Steph.; Selztal, Bdf. (M).
Ootypus globosus Waltl; Bdf., Selztal (M).
Ephytostomus globulus Payk.; Bdf., Selztal (M).

Erotylidae.

- Tritoma bipustulata* F.; Bdf. (M).
Tritoma bipustulata a. incerta Rossi. (= *a. binotata* Reitt.) Selz-
tal Bdf. (M).
Dacne bipustulata Thunb.; Selztal (M).

Phalacridae.

- Phalacrus coruscus* Panz. (*fimetarius* Payk.); Bdf., Selztal (M).
Phal. substriatus Gyll.; Bdf., Gams b. H., Flitzen (M). n. selt.
Phal. caricis Strm.; Selztal (M).
Olibrus corticalis Panz.; Bdf. (M).
Ol. affinis Strm.; Admont (K). Selztal (M).
Ol. bimaculatus Küst.; Selztal, Bdf., Liezen (M).

Lathridiidae.

- Dasyserus sulcatus* Brongn.; Bdf. Kaiserau (M).
Lathridius lardarius Deg.; Selztal, Bdf. (M).
Lath. angusticollis Gyll.; Selztal, Bdf., Wald (M).
Lath. Pandellei Bris.; U. v. A. (K). Selztal n. selt., Bdf., Gams
b. H., Oppenberg (M).
Lath. rugicollis Ol.; Selztal, Gesäuse (M).
Lath. constrictus Gyll.; Selztal, Bdf., Wörschach n. selt. (M).
Lath. nodifer Westw.; Selztal, Bdf., Kaiserau (M).
Enicmus minutus L.; Oppenberg z. hfg. (K). Selztal, Stoder. Z.
(M).

- En. rugosus* Hbst.; Bdf. (M).
En. transversus Oliv.; Selztal, Oppenberg n. selt. (M).
Cartodera elongata Curtis; Bdf., Kaiserau n. selt. (M).
Cart. ruficollis Marsh.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Corticaria pubescens Gyll.; Bdf., Selztal, Aussee (M).
Cort. linearis Payk.; Bdf., Kaiserau (M).
Cort. foveola Beck.; Kaiserau (M).
Cort. longicollis Zett.; U. v. A. (K). Bdf. n. selt., Kaiserau (M).
Cort. serrata Payk.; Bdf., Selztal n. selt. (M).
Cort. saginata Mannh.; Bdf. (M). z. selt.
Cort. elongata Gyll.; Bdf., Selztal, Oppenberg, Liezen (M).
Cort. ferruginea Marsh.; Bdf. (M).
Corticarina (Melanophthalma) similata Gyll.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Corticarina (Melanophthalma) gibbosa Herbst.; Selztal n. selt. (M).
Melanophthalma transversalis Gyll.; Kraubath (M).

Mycetophagidae.

- Mycethophagus atomarius* F.; Bdf., Gesäuse, Kaiserau (M).
Myc. multipunctatus F.; Admont, Bdf. (M).
Myc. populi F.; Bdf. unter Rinde von *Sambucus niger* (M).
Typhaea stercorea L.; U. v. A. (K). überall gemein (M).

Sphindidae.

- Sphindus dubius* Gyll.; Bdf. (M).

Aspidiphoridae.

- Aspidiphorus orbiculatus* Gyll.; Bdf., Wörschach (M).

Cisidae.

- Cis. comptus* Gyll.; Bdf. (M).
Cis. nitidus F. (Herbst); Bdf., Selztal (M).
C. Jacquemarti Mell.; Bdf. (M).
C. Jacquemarti a. glabratus Mell.; Selztal, Bdf. (M).
C. boleti Scop.; Bdf., Selztal, Gesäuse gemein (M).
C. setiger Mell.; Bdf., Strechau, Kaiserau (M).
C. micans F.; Bdf. (M).
C. hispidus Payk. (Gyll.); Selztal, Bdf. n. selt. (M).
C. dentatus Mell.; Bdf., Selztal n. selt. (M).
C. alni Gyll.; Bdf., Selztal z. hfg., Hhd. (M).
C. Lucasi Ab. (*reflexicollis*); Bdf. (M).

- C. bidentatus* Oliv.; Admont, Bdf. (M).
C. festivus Gyll.; Bdf. hfg., Hhd. (M).
C. fagi Waltl (*castaneus* Mell.); Admont (M).
C. punctulatus Gyll.; Bdf. (M).
Ennearthron affine Gyll.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Ennearthron cornutum Gyll.; Bdf. Selztal (M).
Octotemnus glabriculus Gyll.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Octo. mandibularis Gyll.; Selztal (M).

Colydiidae.

- Orthocerus clavicornis* L.; Bdf. (M).
Synchita separanda Reitt.; Gams b. H., Selztal. Bdf. (M).
Synchita humeralis F.; Selztal, Bdf. n. selt., Kaiserau (M).
Ditoma crenata F.; Bdf., Selztal (M). z. hfg.
Cerylon fagi Bris.; Selztal (M).
Cerylon histeroides F.; Selztal, Oppenbergs, Liezen n. selt. (M).
Cerylon ferrugineum Steph.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Endomychidae.

- Sphaerosoma globosum* Strm.; Bdf., (M).
Mycetaea hirta Marsh.; Selztal, Bdf. Oppenbergs (M).
Liesthes seminigra Gyll.; Gams b. H. (K). s. selt.
Mycetina cruciata Schall.; Selztal zahlreich an verpilzten alten
Brettern; Wald, Strechen, Bdf. (M).
Endomychus coccineus L., Admont, Landl, Gröbming (K). Bdf.,
Kaiserau n. selt. (M).

Coccinellidae.

- Subcoccinella 24-punctata* L.; U. v. A. (K). Bdf. (M). n. selt. O.
Zeiring 3 St. (E).
Cynegetis impunctata L.; U. v. A. und Krumauer Moor b. A.,
Selztal n. selt. (K).
Cyn. impunctata a. palustris Redtb.; U. v. A., Krumauer Moor,
Selztal n. selt. (K).
Hippodamia 13-punctata L.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf., Gaishorn
(M).
Hipp. 13-punctata a. Eichhoffi Seidl; Bdf. (M).
Hipp. 7-maculata Deg.; Selztal (M).
Hipp. 7-maculata a. baltica Ws.; Bdf. (M).
Adonia variegata Goeze; Selztal (M).
Ad. variegata a. constellata Laich.; Bdf. (M).

- Ad. variegata a. carpini* Fourer. (Geoffr.); Selztal, Hhd. (M).
Ad. variegata a. neglecta Ws.; Flitzen (M).
Anisosticta 19-punctata L.; Selztal, Gaishorn (M).
Semiadalia notata Laich.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf., Haus (M).
O. Zeiring 1 St. (E).
Aphidecta oblitterata L.; Selztal, Bdf. (M). O. Zeiring 1 St. (E).
Aph. oblitterata a. pallida Thunbg.; U. v. A. selt. (K).
Aph. oblitterata a. libita Deg.; Admont z. selt. (K). Selztal, Bdf. (M).
Adalia conglomerata a. decas Beck.; Bdf. (M).
Ad. bipunctata L.; U. v. A., Gams b. H. hfg. (K).
Ad. bipunctata a. unifasciata F.; U. v. A. (K).
Ad. bipunctata a. 6-pustulata L.; Admont und Umgebung n. selt., auch ans Licht geflogen (K). Gams b. H. (K).
Ad. bipunctata a. 4-maculata Scop.; U. v. A. n. selt. (K).
Ad. bipunctata a. sublunata Ws.; Bdf. (M).
Ad. bipunctata a. lugubris Ws.; Frauenberg im Moor und Krumau auf Sumpfwiesen (K). Bdf. (M).
Ad. alpina Villa; Sub- und hochalpin im Grase; Bdf., Oppenberg, Hhd. T.-Geb. (M). Stein am Mandl 2 St. (K). Zeyr. K. 1 St. im Fluge gef. (K).
Coccinella 7-punctata L.; U. v. A. n. selt. (K). O. Zeiring 2 St. (E).
Cocc. 5-punctata L.; Selztal, Bdf. (M).
Cocc. 11-punctata L.; U. v. A., auch am Moor n. selt. (K). O. Zeiring 1 St. (E).
Cocc. hieroglyphica L.; Krumauer Moor und an Fichten n. selt. (K). Selztal, Bdf. (M).
Cocc. hieroglyphica a. flexuosa F.; Bdf. (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata L.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. pellucida Ws.; Gams b. H. (K).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. subpunctata Schrank; Admont (K). Selztal (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. 8-punctata Müll.; Selztal, Liezen (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. relicta Heyd.; Bdf. (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. humeralis Schall.; Selztal, Bdf., Wörschach (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. bimaculata Font.; Bdf., Hschwg. (M).
Adalia (Cocc.) 10-punctata a. 10-pustulata; Krumauer S.Wiesen (K). Bdf. (M).
Synharmonia (Cocc.) conglobata a. rosea Deg.; U. v. A. s. selt. (K).
Syn. (Cocc.) conglobata a. gemella Hbst.; U. v. A. selt. (K).

- Syn. (Cocc.) conglobata a. impustulata* L.; U. v. A. selt. (K).
Paramysia (Mysia) oblongoguttata L.; U. v. A.. Gesäuse, Landl n. selt. (K). O. Zeiring 3 St. (E).
- Anatis ocellata* L.; U. v. A. (K). Selztal, Bdf. (M).
Anatis ocellata a. Boeberi Cederh.; Selztal (M).
Halyzia 16-guttata L.; Aigen b. A. z. selt. (K). Bdf., Wörschach, Hhd. (M).
- Vibidia 12-guttata* L. (Poda); Bdf. (M).
Myrrha 18-guttata a. silvicola Ws.; Bdf. (M).
Thea 22-punctata L.; Selztal, Bdf. (M).
Calvia 14-guttata L.; U. v. A., Gams b. H. n. selt. (K.) Oppenberg (M). O. Zeiring 1 St. (E).
Calvia 14-guttata a. ocelligera Ws.; Gams b. H. selt. (K). Bdf. (M).
Propylaea 14-punctata L.; U. v. A. n. selt. (K). O. Zeiring 1 St. (E).
Prop. 14-punctata a. tetragonata Laich.; Selztal (M).
Prop. 14-punctata a. suturalis Ws.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Prop. 14-punctata a. fimbriata Sulz.; U. v. A. selt. (K). Selztal (M).
Chilocorus renipustulatus Scriba.; U. v. A. und Aigner Moor von Legföhren geklopft z. selt. (K). Selztal, Bdf. (M).
Exochomus 4-postulatus L.; Aigner Moor z. selt. (K). Selztal, Bdf. (M).
Brumus oblongus Weidb.; auf abgeblühten Legföhren hfg.: (K). Aigner Moor, Selztaler Moor, Gesäuse, Pürgg. T.-Geb., Sengs.-Geb. (M).
Hyperaspis reppensis Herbst.; Bdf. (M).
Hyp. campestris Hbst.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Scymnus (Pullus) ferrugatus Moll.; U. v. A. z. hfg. (K).
Sc. (Pullus) auritus Thunbg.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Sc. (Pullus) impexus Mulls.; Bdf. (M).
Sc. (Pullus) testaceus a. scutellaris Mulls.; Bdf. (M).
Sc. (Pullus) testaceus a. concolor Ws.; Bdf. (M).
Sc. (Pullus) suturalis Thunbg.; Bdf., Kraubath (M).
Sc. nigrinus Kugel; Bdf., Selztal (M).
Sc. abietis Payk.; Selztal (K). Bdf., Hhd. (M).
Sc. frontalis F.; Selztal, Bdf., Mautern (M).
Sc. rubromaculatus Goeze; Selztal (M).
Sc. (Nephus) 4-maculatus Hbst.; U. v. A. selt. (K).
Sc. (Nephus) Redtenbacheri Muls.; Bdf., Selztal (M).
Sc. (Stethorus) punctillum Ws.; Bdf. (M).

Coccidula scutellata Hbst.; Gaishorn n. selt. (M).

Cocc. rufa Hbst.; Selztal, Gaishorn n. selt. (M).

Helodidae.

Helodes minuta L.; U. v. A. (K). Bdf., Oppenberg (M).

Hel. Hausmanni Gredl.; Wald (M).

Hel. marginata F.; Bdf., Oppenberg (M).

Microcara testacea L.; Bdf., Selztal (M).

Cyphon variabilis Thunbg.; U. v. A. n. selt. (K).

Cyphon variabilis a. *nigriceps* Kiesw.; U. v. A., Krumauer Moor (K) Bdf. (M).

Cyphon padi L.; Krumauer Moor z. selt. (K).

Cyphon padi a. *discolor* Pz.; Selztal (M).

Cyphon padi a. *gratiosus* Kol.; Selztal (M).

Cyphon coarctatus Payk.; Aigen b. A. (K). Selztal, Bdf. (M).

Cyphon Paykulli Guér; Selztal (M).

Cyphon Paykulli a. *macer* Kiesw.; Selztal (M).

Prionocyphon serricornis Müll.; Selztal (M).

Scirtes hemisphaericus L.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Eubria palustris Germ.; Bdf., Selztal, Paß Stein n. selt. (M).

Dryopidae.

Dryops viennensis Heer (Cast.); U. v. A. (K). Selztal (M). n. selt.

Dryops auriculatus Geoffr.; Selztal (M).

Dryops Ernesti Goziz; U. v. A., Gesäuse (K). Bdf., Oppenberg n. selt. (M).

Esolus angustatus Müll.; Gesäuse, Liezen Pyhrnpaß, St. Gallen (M). n. selt.

Esolus parallelepipedus Müll.; Dachstein (M).

Lathelmis Perrisi Duf.; Selztal, Bdf., Pyhrnpaß, Admont (M). n. selt.

Lathelmis Volckmari Pz.; Bdf. (M).

Riolus nitens Müll.; Selztal (M).

Helmis Latreillei Bed.; Bdf., Kaiserau, Gesäuse (M). n. selt.

Helmis Maugei a. *aenea* Müll.; Bdf. (M).

Georyssidae.

Georyssus crenulatus Rossi.; Bdf., Wörschach (M).

Heteroceridae.

Heterocerus marginatus F.; Selztal, Bdf. n. selt. (M).